



# Banminth<sup>®</sup> vet.

oral pasta, *pyrantelembonat*



# Banminth® vet.

oral pasta, *pyrantelembonat*

För behandling av spolmask och hakmask i tarmen hos hund och katt.

- Kan ges under dräktighet och i digivningsperioder.
- Till hund: Banminth vet. 2,2 % oral pasta, 10 g, 16 g och 24 g. Till katt: Banminth vet. 12 % oral pasta, 2 g och 3 g.





## Inälvsmask

Inälvsmask är parasiter som kan orsaka obehag och sjukdomar hos hundar och katter. Vanliga symtom är allmän slöhet, diarré, viktminskning, kräkningar, hosta och glanslös päls. Det är ändå inte så lätt att upptäcka inälvsmask, vuxna djur kan vara angripna utan att visa yttre tecken på sjukdom.

## Spolmask

Den parasit som oftast förekommer hos hundar och katter i Sverige är spolmask (hos katter även bandmask). Den förekommer oftast hos nyfödda valpar och kattungar och i varierande grad hos vuxna individer. Spolmask smittar via modersmjölk, infekterade vuxna djur och bytesdjur.

## Andra inälvsmaskar

Hakmask och bandmask är andra maskar som kan förekomma. Bandmask kan förekomma hos utekatter som jagar möss och råttor. Vid misstanke om förekomst av dessa parasiter, eller om du är osäker bör du ta kontakt med din veterinär för att få ett lämpligt behandlingsprogram.

## Banminth® vet.

Banminth vet. har ett smalt spektrum och är effektivt mot spolmask och hakmask. Tolereras väl - liten risk för överdosering. Enkelt att ge - välsmakande pasta. En dos per behandlingstillfälle. Öppnad dosspruta ska ej sparas. Receptfritt läkemedel på apoteket.

## Banminth® vet. 2,2 % oral pasta till hund

**Valpar** kan behandlas vid ca 2 veckors ålder och därefter vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder.

**Tiken** behandlas samtidigt med valparna första och andra gången.

**Vuxna hundar** behandlas vid påvisad förekomst av spolmask och behandlingen upprepas efter ca 10-14 dagar.

## Banminth® vet. 12 % oral pasta till katt

**Kattungar** kan behandlas vid ca 2 veckors ålder och därefter vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder.

**Kattan** behandlas samtidigt med ungarna första och andra gången.

**Vuxna katter** behandlas vid påvisad förekomst av spolmask och behandlingen upprepas efter ca 10-14 dagar.

## Förpackningar

Produkten är speciellt utvecklad till varje djurslag. *Var därför uppmärksam på vilken typ av Banminth vet. du köper på apoteket.*

### Förpackningar till hund, 2,2 %

**10 g tub** räcker till hund som väger 15 kg

**16 g dosspruta** räcker till hund som väger 24 kg

**24 g tub** räcker till hund som väger 36 kg

### Förpackningar till katt, 12 %

**2 g dosspruta** räcker till katt som väger 4 kg

**3 g dosspruta** räcker till katt som väger 6 kg

Doseringsanvisningar, se nästa sida.

ATC vet-kod: QP52A F02

Texten är baserad på produktresuméer daterade 2008-07-17.

**För mer information läs bipacksedeln eller gå in på [www.fass.se](http://www.fass.se)**



## Dosering - hund

Om preparatet erhållits på recept, följ alltid veterinärens dosering.

**Tub:** en 2 cm lång sträng av pastan ges för varje kilo hunden väger. (Det motsvarar 0,67 g av pastan.)

Då räcker en tub om 10 g för behandling av en hund som väger 15 kg och en tub om 24 g räcker för 36 kg hund.

**Dosspruta:** Sprutan är graderad och varje delstreck motsvarar 2 kg. En spruta om 16 g räcker för behandling av 24 kg hund.

Av tuben ges	Hundens vikt	Av sprutan ges
4 cm	2 kg	1 delstreck
8 cm	4 kg	2 delstreck
20 cm	10 kg	5 delstreck

## Dosering - katt

Om preparatet erhållits på recept, följ alltid veterinärens dosering.

Ett streck på doseringssprutan eller 0,5 g pasta ges per kg kroppsvikt.

Kattens vikt	Av sprutan ges
1 kg	1 delstreck
2 kg	2 delstreck
3 kg	3 delstreck

En 2 g spruta räcker till behandling av en katt som väger 4 kg och en 3 g spruta räcker för 6 kg katt.

Marknadsförs av:

**Pharmaxim**

Pharmaxim AB Stenbrovägen 32, SE-253 68 Helsingborg

Tel: 042-38 54 50, Fax: 042-38 54 41

info@pharmaxim.com, www.pharmaxim.com

Tillverkare:

Pfizer Animal Health