

DIMILIN®

Bekämpning av fluglarver



DIMILIN

DIMILIN® bekämpning av fluglarver

Granulat 1250 g.

Bekämpar effektivt flugor i djurstallar, gödsel/kompost-stackar och mulltoaletter genom att hindra fluglarver att utvecklas till vuxna flugor.

Dimilin® är en sk larvicid som ger en effektiv flugkontroll samtidigt som det är mycket låggiftigt för människor och djur. Dimilin dödar endast fluglarverna, vilket gör att effekten märks först efter ett par veckor.

Dimilin granulat strös ut över den yta som skall behandlas.

Flugan har en enorm reproduktionsförmåga (2 kan bli 25 milj. på en sommar). Det effektivaste sättet att bekämpa flugorna är att hindra fluglarven att utvecklas till en fluga. En flugbekämpning i stallen med Dimilin som bas, kompletterad med klisterfällor och/eller spray, klarar de flesta stallars problem. En normal sommar räcker det med 4 behandlingar med Dimilin.

Användning

Kostallet: Kalvboxar är oftast den stora kläckningsplatsen för flugor. Efter rengöring och ströning, vänta 3-7 dagar före behandling av ströbädd och längs boxkanter. Upprepa efter 1 månad. Gödselrännor och hörn längs foderbord/golv kan vara kläckningsplats om rengöring inte sker regelbundet.

Svinstallet: Galtboxar är en flughärd i många stallar. Ströbädden i hela boxen behandlas var 4:e vecka. Sinsuggavdelning på ströbädd medför ofta stora problem. Viktigt att behandla längs alla ytterväggar. Suggavdelningen behandlas längs mellanväggar och under fodertråg. Vid spaltgolv behandlas längs skiljeväggar och utmed kanterna med 4 veckors intervall.

Fårstallet: Ströbädden behandlas 1 gång i månaden. Var noga med att behandla längs väggar och under vattenkoppar.

Häststallet: Behandla längs boxväggar och där det är svårt att göra rent regelbundet. Upprepa var 3-4:e vecka. Gödsel/kompost-stackar, gödselbassänger: Behandla utmed kanter på stacken och bassängen. Upprepa behandlingen var 3-4:e vecka. Om gödsel/kompoststacken flyttats för mellanlagring behandlas hela ytan.

Mulltoaletter: Behandla rakt under toaletsitsen samt utmed kanterna på toaletten. Upprepa var 3-4:e vecka om mulltoaletten utnyttjas regelbundet. Vid sporadisk användning kan behandlingsfrekvensen sänkas.

Dosering

Strö ca 12 g Dimilin per m² (motsvarar knappt en matsked). En förpackning räcker till 100 m². Vid behandling med Dimilin bör man tänka på att ytan måste vara fuktig för att granulatet skall lösa sig. Är ytan inte tillräckligt fuktig bör man eftervattna.

Det är viktigt att hålla rätt dosering. Börja alltid längs väggar i boxar. För bästa resultat - Läs och följ bruksanvisningen på förpackningen.

Deklaration

Verksam beståndsdel: Diflubensuron 4 viktprocent.

Formulering: Granulat.

Förvaring: Torrt.

Lagringsstabilitet: Minst 2 år.

Följ alltid etikettens anvisningar!