

EFFYDRAL

EFFYDRAL®

Elektrolyter vid diarré



EFFYDRAL[®] elektrolyter vid diarré

48 tabletter

Effydral har en väsentligt högre natriumkoncentration än andra elektrolytprodukter, vilket befrämjar optimal vattenabsorption.

Effekt

Upptag av vatten från tarmkanalen är en passiv process som ett resultat av ett aktivt natriumupptag. Upptag av natrium från tarmkanalen är kopplad till upptag av glukos, galaktos, aminosyror och andra små organiska molekyler. Djurstudier har visat att maximalt upptag av natrium och därmed även vatten sker när förhållandet mellan dessa molekyler och natrium ligger mellan 1:1 och 2:1. I Effydral är förhållandet mellan glukos/galaktos/glycin och natrium 1,75:1.

Användning

Effydral bör sättas in så snart symtom på diarré uppträder.

1 liter brukslösning bereds genom att 1 brustablett upplöses i 1 liter ljummet vatten.

Färdigberedd lösning skall bytas ut var 24:e timme.

Kalvar: Dag 1 och dag 2 ges 2 liter Effydral lösning 2 gånger dagligen istället för mjölk eller mjölkersättning.

Dag 3 och 4 ges 1 liter Effydral lösning och 1 liter mjölk eller mjölkersättning som skilda mål (med 1/2 till 1 timmes mellanrum) 2 gånger dagligen.

Smågrisar: Diande smågrisar: Hela kullen skall ha fri tillgång till Effydral lösning.

Avvänningsgrisar: Hela gruppen skall ha fri tillgång till Effydral lösning som komplement till vanligt dricksvatten.

Deklaration

Innehållsförteckning (per tablett):

Natriumklorid 2,34 g

Kaliumklorid 1,12 g

Natriumvätekarbonat 6,72 g

Citronsyra, vattenfri 3,84 g

Laktos 32,44 g

Glycerin 2,25 g

Förpackningar: Varje förpackning innehåller 48 st brustabletter, där varje brustablett är individuellt förpackad.

Tillverkare: Fort Dodge Animal Health Europe.