

J2/EWODIP®

Spendopp

J2/EWODIP



J2^P
KONCENTRAT / KONSENTRAT / TIVISTE

E W O D I P
5L

KONCENTRAT / KONSENTRAT / TIVISTE
SPENDOPPNINGSMEDEL med PVP-jod
PATTEDYPNINGSMEDEL med PVP-jod
PVP-jodi VEDINKASTO

Späda med 5 delar vatten före användning.
Fortyndas med 5 dele vand før anvendelse.
Sekoita 1 osa Ewodippiä 5 osaan vettä.

SPENDOPPNINGSMEDEL FÖR
DOPPNING OCH SPRAYNING AV
SPENARNÄR EFTER MÖLKNING
BRUKSANVISNING: 1 del spendopp
blandas med 5 delar vatten. Doppa
spenarna omedelbart efter varje
mjölkning. Spendoppa även senkor
och högsärliga kojar.

PATTEDYPNINGSMEDEL TIL
DYPPNING OG SPRAYNING AF
PATTERNE EFTER MALKNING
Brugsanvisning: 1 del dyppnings-
medel blandes med 5 dele vand. På-
spray pattene umiddelbart efter hver
malkning. Gokobner og højstrøjlige
kvæer bør også behandles.

Opbevaring: Må kun opbevares i
originaltætte og ikke sammen
med levnedsmidler.

MSAEDINFEKTIOONNAHENO
UTARÄPÖLTIKE VÄLTIMISEKS.
Seko 1 osa konsentratin 5 osaa vettä.
Kasta risad sööfussele kohe igä
lõpet järgest. Kasta ka sinnelehmade
risad 1 kort nädalas.

LYPÄYN JÄLKEEN KÄYTETTÄVÄ
VEDINKASTOANE.
Sekoita 1 osa Ewodippiä 5 osaa
vettä. Kasta vännel käyttökoosten
het joka lypäyn jälkeen. Käsittele
myös ummessa olevien lehmien
vännel.

Lepra hoitoon.
Lepra hoitoon.
Kallista kilmunitee saat.
Suojattava jalkavaino.

koskijälkekoostime:
1% jodi / 100 ml PVP-jodi
1% jodi / polyvinylidoni
1% jodi / PVP-jodi

Pharmaxim
Puhuttiin, Suomeksi
Suomenkatu 30,
210 00 Rauma
Puh: 00 30 14 32

Danmark: Tlf 96 37 84 11
Suomi: puh: 202 500
www.pharmaxim.com

Barcode: 7 311596 070117

ANUOTTA
Käy, etnord
Keskide etnord

J2/EWODIP® spendopp

5 liter. Artikelnummer: 607011.

Bakterier som finns på spenhuden och i miljön runt juvret kan mycket lätt tränga in genom spenkanalens mynning efter mjölkningen innan spenkanalen hinner sluta sig.

Spenkanalen stängs först cirka 30 minuter efter avslutad mjölkning.

Om bakterier kommer in kan dessa sprida sig vidare upp i juvret och orsaka juverinflammation (mastit).

Särskilt stor är risken för detta om det finns sår och sprickor på spenar och juver, exempelvis genom spentramp, taggtrådsskador, felaktig mjölkningsteknik etc. För att förhindra dessa bakterier från att ta sig in via spenöppningen måste de avödas.

Detta sker genom förebyggande åtgärder som spendoppning eller sprayning.

Användning

J2/Ewodip används för doppning av spenarna efter mjölkningen för att hindra mastitframkallande bakterier att komma in i spenkanalen. Spendoppa kvigor två veckor före inkalvning.

Bruks- och spädningsanvisning

Bruksanvisning	Mängd koncentrat	Mängd vatten	Jodkoncentrat i färdig lösning
Doppning av spenarna efter mjölkning. Doppningen ska utföras direkt efter mjölkningen då spenkanalen fortfarande är öppen.	1 del	5 delar	1.660 ppm

Deklaration

Koncentrerad PVP-jod som innehåller 10.000 ppm jod. **J2/Ewodip** koncentrat skall spädas före användning, 1 del koncentrat till 5 delar vatten.

Förpackningsstorlek

5 liter