

Hur smittas katter?

En av fem utekatter har spolmask. Den vanligaste orsaken är att katter äter små gnagare så som möss och råttor. Katter kan även smittas med spolmaskägg direkt från andra katter. Kattungar kan smittas via modersmjölken när de diar.

Hur vet jag när min katt behöver avmaskas?

Tecken på spolmaskinfektion:

- Dålig tillväxt
- Dålig pälskvalitet
- Diarré och kräkningar
- Svullen buk
- Maskar eller ägg i avföringen. Maskarna är 2-5 cm långa och spaghetti-liknande.

Om du är osäker på om din katt har mask ska du vända dig till din veterinär, eller skicka in ett avföringsprov för analys till t.ex. SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

Vad ska man tänka på när man avmaskar sitt husdjur?

Avmaska klokt och undvik risk för resistensutveckling. Behandla bara katter som behöver avmaskas. Väg katten och dosera noga. Tala med din veterinär - där kan du få tips och råd angående avmaskning.

Preparaten är receptfria läkemedel och finns på apotek.



Banminth® vet. 12 % oral pasta

Tydlig doseringsangivelse

En dos per behandling

Receptfritt läkemedel



För mer information om Banminth vet. kontakta oss gärna:

Pharmaxim


Tel: 042 38 54 50, info@pharmaxim.com
www.pharmaxim.com

Tillverkare: **zoetis**

Texten är baserad på produktresumé daterad 2015-07-27. För mer information läs bipacksedeln eller gå in på www.fass.se. Texten granskad och godkänd av Leg. veterinär (Doctor of Veterinary Medicine) Johannes Larsson, Pharmaxim 2016-12-29.

Hur ska katter avmaskas på ett bra sätt?

Banminth® vet.
Pyrantelmonat



Receptfritt avmaskningsmedel för behandling av spolmask och hakmask hos katt.



Olika typer av mask

Spolmaskar

Spolmask är en av de vanligaste parasiterna hos katt. De är gul-vita i färgen, långsmala och kan bli 2-5 cm långa. Katter smittas via avföring, små gnagare eller från modersmjölken.

Kattens spolmask smittar inte till människor.

Banminth vet. är ett effektivt avmaskningsmedel för behandling av spolmask hos katt.

Hakmaskar

Hakmaskar hos katt är relativt ovanligt i Sverige, men förekommer ofta hos katter utomlands. Importerade katter löper därför större risk att bära med sig hakmaskinfektion.

Banminth vet. är ett effektivt avmaskningsmedel för behandling av hakmask hos katt.



Vad är Banminth vet.?

Banminth vet. är ett receptfritt avmaskningsmedel som är effektivt mot spolmask och hakmask hos katt. Banminth vet. har få biverkningar och risken för överdosering är liten.

Hur används Banminth vet.?

Banminth vet. finns som förfylld doseringsspruta fylld med pasta. Banminth vet. ges i munnen till katten. Väg katten före behandling för rätt dosering.

Dosering	
Kattens vikt	Antal streck på doseringssprutan
1 kg	1 delstreck
2 kg	2 delstreck
4 kg	4 delstreck
5 kg	5 delstreck
6 kg	6 delstreck

Banminth vet. 2 g räcker till en katt som väger 4 kg.

Banminth vet. 3 g räcker till en katt som väger 6 kg.



Vuxna katter

Vuxna katter ska avmaskas när de har tecken på spolmaskinfektion. Det räcker oftast med en behandling, men i vissa fall behöver behandlingen upprepas efter ca 14 dagar.

Katter som bara lever inomhus behöver som regel inte avmaskas.

Kattungar

Kattungar kan bli smittade av spolmask via modersmjölken. Kattungar kan behandlas från ett par veckors ålder och därefter vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder.

Det är bra att avmaska kattmamman samtidigt som kattungarna vid första och andra avmaskningen (d.v.s. när kattungarna är 2 och 4 veckors gamla).