

13/04/2026

## Partoxin® Vet (Oxytocin), 100 ml Flaska – Felaktig information på ena sidan av ytterförpackningen.

### Bästa veterinär,

Pharmaxim AB vill, i samråd med **Läkemedelsverket**, informera om följande:

- Felaktig information förekommer på ena sidan av ytterförpackningen till **Partoxin® Vet (100 ml)** på produkter producerade efter 2024. Korrekt information finns på motsatt sida av förpackningen samt i medföljande bipacksedel.
- Den felaktiga informationen avser **godkända djurslag, karenstider, hållbarhet efter öppning och förvaring. Se nedan summerande tabell.**

Korrekta uppgifter	Inkorrekta uppgifter
Djurslag: Nöt, häst, svin och hund	Djurslag: Svin, <b>får</b> och nötkreatur
Karenstid: Slakt: Nöt häst och svin, <b>noll</b> dagar Mjök: noll dagar	Karenstid: Slakt: <b>2 dygn</b> Mjök 0 dygn
Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C)	Förvaras vid högst 25 °C
Öppnad förpackning hållbar i 7 dagar vid högst 25 °C	Hållbarhet i bruten förpackning: 4 veckor

- **Viktigt:**
  - **Öppnad flaska ska förvaras i kylskåp.** Felaktig förvaring kan möjligen påverka läkemedlets effekt.
  - **Läkemedlet ska inte användas längre än 7 dagar efter öppnande.**
  - **Får är inte ett godkänt djurslag.** Användning till får är off-label och ska baserat på en veterinärs kunskap och erfarenhet.
  - **Karenstiden är 0 dygn för slakt.**
- Läs alltid **bipacksedeln (PIL)** före användning. Länk till FASS: <https://fass.se/animal/product/19561220000013/pl>
- Ansvariga veterinärer inom villkorad läkemedelsanvändning (**ViLA**) uppmanas att **informera berörda djurhållare** samt vid besättningsbesök **kontrollera** korrekt förvaring och dokumentation för Partoxin® vet, 100 ml flaskan.

### Bakgrund

Vid framtagning av ny ytterförpackning för Partoxin® Vet 100 ml flaska har ett fel uppstått där inkorrekt information felaktigt tryckts på ena sidan av kartongen.

Partoxin® Vet (oxytocin) är ett injicerbart veterinärmedicinskt läkemedel avsett för användning hos nöt, häst, svin och hund. Läkemedlet används främst som värförstärkande medel vid partus samt för att öka livmodertonus vid olika obstetriska och puerperala tillstånd.

Kommunikationen riktas i första hand till veterinärer verksamma inom stordjurspraktik, då det bedöms som osannolikt att 100 ml-förpackningen används inom smådjurspraktik där mindre förpackningar (10 ml, antingen som 5- eller 10-pack) finns tillgängliga. 10-ml förpackningarna har korrekt information.

Partoxin® vet kan förskrivas under villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) till livsmedelsproducerande djurhållare. Ansvariga veterinärer uppmanas att förmedla informationen till berörda kunder och kontrollera att produkten har använts och förvaras enligt medföljande bipacksedel (PIL).

Den mest betydande risken i den felaktiga informationen är kopplad till felaktig förvaring av oöppnad förpackning (ska förvaras i kylskåp), vilket kan leda till nedsatt eller utebliven effekt. Vid användning som värkstimulerande läkemedel kan detta få allvarliga kliniska konsekvenser.

Har produkten **använts felaktigt** eller det finns misstanke om **biverkningar** så som exempelvis utebliven effekt uppmanas man att ta kontakt med Pharmaxim AB.

Arbetet med att ta fram **nya ytterförpackningar** med korrekt information är pågående. Dessa uppskattas nå marknaden under 2027.

## **Rapportering**

Veterinärer uppmanas att rapportera:

- Fall där produkten kan ha använts felaktigt
- Misstänkta biverkningar

Vid frågor vänligen kontakta Pharmaxim AB.

Rapportering av biverkningar ska ske enligt nationellt rapporteringssystem via LäkeMedelsverket eller via kontakt med Pharmaxim AB.

## **Kontaktuppgifter**

För ytterligare information, vänligen kontakta:

### **Pharmaxim AB**

Telefonnummer till veterinär: 042 - 38 54 05, tillgänglig mån-tis 7.30-15.30.

E-post: [drugsafety@pharmaxim.com](mailto:drugsafety@pharmaxim.com)

Webbplats: <https://www.pharmaxim.com>